

Larwoterapia, znana również jako biochirurgia lub LTR (Larwalna terapia ran), to metoda leczenia trudno gojących się ran. Polega na wykorzystaniu wyhodowanych w sterylnych warunkach larw muchy plujki (najczęściej *Lucilia sericata*) do oczyszczania rany

Czas trwania: Jedna sesja trwa zazwyczaj od 2 do 4 dni, po czym larwy są usuwane. Zabieg może być powtarzany w zależności od potrzeb.

Co czuje pacjent w trakcie terapii?

Dyskomfort lub ból. Większość pacjentów nie odczuwa żadnego bólu. Larwy żywią się wyłącznie martwą, zakażoną tkanką i nie uszkodzają zdrowych tkanek, dlatego proces jest bezbolesny. Niektórzy pacjenci mogą jednak odczuwać delikatne mrowienie lub łaskotanie w ranie, które jest związane z poruszaniem się larw. Jeśli ból się nasila, zwykle świadczy to o innym problemie (np. rozwijającej się infekcji), a nie o samej terapii.

Odczucia związane z raną: Ponieważ larwy rozpuszczają martwą tkankę za pomocą swoich enzymów, może pojawić się zwiększona ilość wydzieliny. Czasem może ona mieć brązowy lub różowy kolor i charakterystyczny, ostry zapach. Jest to normalny efekt działania larw i ustępuje po ich usunięciu.

Bariera psychologiczna

Największym wyzwaniem dla pacjentów jest zazwyczaj przezwyciężenie psychicznej bariery i wstrętu do larw. Ważne jest, aby wyjaśnić, że używane w terapii larwy są specjalnie hodowane w sterylnych warunkach i są całkowicie bezpieczne. Ponadto, rana jest zakryta opatrunkiem, więc pacjent nie musi oglądać larw. Na koniec terapii, rana jest znacznie czystsza, co często prowadzi do zmniejszenia bólu, który wcześniej towarzyszył infekcji.

Pielęgnacja rany po zabiegu:

Usuwanie larw: Po zakończeniu terapii larwy zostaną usunięte z rany przez personel medyczny. Nie próbuj samodzielnie usuwać larw.

Opatrunek: Bezpośrednio po zabiegu na ranie zostanie zastosowany odpowiedni opatrunek specjalistyczny

Zmiana opatrunku: W trakcie sesji larwamioprunek podlega kontroli przez specjalistę w kolejnych dniach.

Obserwacja rany:

Regularnie sprawdzaj ranę pod kątem następujących objawów, które mogą świadczyć o infekcji lub innych powikłaniach:

Wzrost zaczerwienienia lub obrzęku wokół rany.

Gorączka lub dreszcze.

Zwiększony ból w obrębie rany.

Nieprzyjemny zapach z rany.

Zmiana koloru lub zwiększona ilość wydzieliny (ropna, zielonkawa).

Regularne wizyty kontrolne: Należy stawiać się na wszystkie zaplanowane wizyty kontrolne. Personel medyczny oceni postępy w gojeniu i dostosuje dalsze leczenie.